

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD)

La EGD es un procedimiento para inspeccionar el revestimiento de tu esófago, estómago y la primera parte de tu intestino. Se utiliza para identificar inflamación, sangrado, úlceras, tumores, cánceres, infecciones y otras preocupaciones.


Antes del Procedimiento

- Es posible que necesites ajustar tus medicamentos para la diabetes y anticoagulantes según las indicaciones de tu médico.
- Puedes seguir una dieta normal el día antes del procedimiento.
- Deja de comer todos los alimentos sólidos 8 horas antes de tu procedimiento. Los líquidos claros son aceptables hasta 2 horas antes de tu llegar al hospital. Los líquidos claros incluyen agua, Gatorade®, jugo de manzana, café negro y refrescos.
- Toma tus medicamentos habituales de la mañana con un vaso de agua.

Durante el Procedimiento

- Llegarás al hospital y el personal de enfermería te preparará para el procedimiento y la sedación.
- Conocerás a tu médico endoscopista para revisar detalles y responder cualquier pregunta.
- La enfermera puede adormecerá tu garganta con un spray para evitar la sensación de náuseas.
- Recibirás sedación durante el procedimiento para mantenerte cómodo y relajado.
- Durante el examen, se usará un tubo flexible delgado con una cámara para inspeccionar tu esófago, estómago y la primera parte de tu intestino. Se podrán realizar intervenciones y toma de muestras de tejido durante el procedimiento para ayudar a identificar y tratar cualquier problema.

Upper endoscopy



Después del Procedimiento

- Necesitarás que alguien te lleve a casa después del procedimiento debido a la sedación.
- Te recuperarás de la sedación y el médico revisará los resultados del procedimiento contigo.
- Se te permitirá comer y beber una vez que la sensación de adormecimiento en la garganta haya pasado.
- No conduzcas durante 24 hora después del procedimiento debido a los medicamentos de la sedación.
- Puedes retomar una dieta normal.
- Si se tomó alguna muestra de tejido durante el procedimiento, el médico generalmente te enviará una carta con los resultados en 1-2 semanas.

Por favor, sigue cuidadosamente las siguientes instrucciones.

LA SEMANA ANTES DE TU PROCEDIMIENTO:

Si eres diabético, recibirás instrucciones de tu médico principal sobre cómo ajustar tu medicación si es necesario. Contacta su consultorio para obtener instrucciones.

Si estás tomando medicamentos anticoagulantes (Coumadin® (Warfarina®), Plavix® (Clopidogrel), Pradaxa®, Xarelto® y Eliquis®) recibirás instrucciones de tu médico principal sobre cómo ajustar tu medicación si es necesario. Contacta su consultorio para obtener instrucciones.

En general, si estás tomando Coumadin® (Warfarina®) normalmente necesitarás suspender tu medicación 4 días antes para reducir cualquier complicación por sangrado.

EL DÍA DE TU PROCEDIMIENTO:

Puedes tomar tus medicamentos habituales de la mañana con un vaso de agua hasta 2 horas antes de tu hora de registro.

No comas ningún alimento sólido durante las 8 horas antes de tu procedimiento. Es necesario que tu estómago esté vacío para permitirnos realizar el examen adecuadamente y obtener una buena visualización. Si comiste algo antes del procedimiento, es posible que tengamos que cancelar o reprogramar tu examen.

Está bien beber líquidos claros hasta 2 horas antes de tu llegada al hospital.

Los líquidos claros son: agua, té, café negro simple, jugo sin pulpa, Crystal Light®, Kool-Aid®, Gatorade®, refresco, caldos, gelatina®, paletas de hielo®, caramelos duros y chicle.

Mantente hidratado y bebe líquidos claros durante toda la mañana si tu examen es más tarde en el día.

Si tienes alguna pregunta o preocupación sobre la preparación de tu EGD,
llama a Servicios Quirúrgicos al (715) 284-3678.